

Vorgehen nach Nadelstichen

ITALIENISCH

Procedura in seguito a puntura d'ago o simili contatti con sangue potenzialmente infetto. Informazioni per i dipendenti nel servizio di pulizia e per gli aiutanti

Su quasi tutti gli aghi delle siringhe usate rimane un pò di sangue. Una sola puntura d'ago è sufficiente per trasmettere malattie come l'epatite B, l'epatite C o in rari casi anche l'AIDS. Lo stesso vale anche per le ferite causate da bisturi usati o dal trapano del dentista, dagli aghi per le fleboclisi insanguinati ecc., vale anche per contatti di sangue sulla pelle ferita e sulle mucose.

L'epatite B è una malattia pericolosa del fegato, che non guarisce più ma che per l' 1 % dei casi porta alla morte entro poche settimane o per il 5-10 % degli infettati rimane cronica.

Se si è punto/a con una cannula usata o se si è tagliato/a lasci che la ferita finisca di sanguinare, la disinfetti e avvisi subito il medico d'azienda o se questi non è raggiungibile un altro medico. Controllando i Suoi documenti o con un prelievo di sangue si può chiarire se esiste rischio d'infezione. Probabilmente è necessaria una vaccinazione preventiva attiva o in combinazione attiva/passiva. É molto utile se Lei può fare il nome del paziente dal quale proviene la siringa o la cannula.

Per favore, rifletta che i contatti sanguigni si hanno a volte in modo insolito e che spesso non ce ne si rende conto. La prevenzione migliore per l'epatite B è perciò la vaccinazione contro l'epatite B. Chi nel suo lavoro può venire a contatto con il sangue e non è protetto contro l'epatite B, dovrebbe vaccinarsi.

Se Lei non sa se è vaccinato/a contro l'epatite B, chieda al medico d'azienda !