

### Vorgehen nach Nadelstichen

POLNISCH

#### Dla osób zatrudnionych w służbie porządkowej i mających kontakt z krwią (Nadelstich-ukucie igłą)

W wielu używanych igłach znajdują się resztki krwi. Jedno ukucie brudną (zurzytą) igłą może wywołać chorobę zwaną **Hepatitis B, C**, w rzadkich przypadkach nawet **HIV (AIDS)**. Dotyczy to również skaleczeń używanym skalpelem, wiertłem dentystycznym, kroplówkami jak również kontakt z krwią osób skaleczonych.

Choroba Hepatitis B-jest groźną chorobą wątroby, która nie zawsze jest wyleczalna, nawet 1% w krwi może spowodować w ciągu paru tygodni zgon, a w przypadkach 5-10% mogą pozostać chroniczne powikłania.

Jeżeli nastąpi ukucie używaną igłą lub skaleczenie (przecięcie) należy ranę wykrwawić i zdezynfekować a następnie jak najszybciej zameldować wypadek u lekarza zakładowego. Po pobraniu krwi i sprawdzeniu akt osobistych można stwierdzić ryzyko zakażenia. Istnieje możliwość szczepienia dla ochrony własnego zdrowia. Pomocą jest również podanie nazwiska osoby od której istnieje prawdopodobnie możliwość infekcji i zakażenia.

Proszę wziąć pod uwagę, że kontakt z krwią często może spowodować rzadko spotykane stany choroby o których nawet się nie wie. Najlepszym zapobieganiem przeciwko Hepatitis B jest szczepionka, każdy kto w czasie pracy ma kontakt z krwią i nie jest szczepiony przeciw Hepatitis B powinien się zaszczepić.

**Kto nie wie czy jest szczepiony przeciw Hepatitis B, proszę zgłosić się do lekarza zakładowego.**