

Vorgehen nach Nadelstichen

RUMÄNISCH

Măsuri de protecție după înțepături cu ace de seringă folosite – Instrucțiuni pentru cadrele de curățenie și ajutorare

La cele mai multe ace de seringi folosite rămân resturi de sînge. O singură înțepătură cu un asemenea ac, poate să fie suficientă la contaminarea cu HEPATITA B, HEPATITA C sau în cazuri foarte rare cu SIDA. Aceasta se poate întîmpla și în cazul rănirilor cu bisturii folosite sau burghie dentare, sisteme de perfuzie însîngerate sau cu alte articole asemănătoare, și deasemenea la contactul pielii lezate sau mucoaselor cu sînge.

HEPATITA B este o boală periculoasă a ficatului care nu se vindecă întodeauna, ci devine deseori cronică sau uneori duce în timp scurt la moarte.

Dacă v-ați înțepat sau tăiat, lăsați rana să sîngereze, desinfectați-o bine și reclamați accidentul imediat medicului muncii – sau dacă nu este accesibil – altui medic. Prin verificarea actelor medicale sau prin recoltarea sîngelui dvs. se poate afla repede dacă există un risc de contaminare. Pentru siguranța dvs. s-ar putea să fie necesar, să se facă un vaccin. Ar fi de ajutor dacă știți numele pacientului, cu acul căruia v-ați accidentat.

Vă rugăm să aveți în vedere, căci contactul cu sînge se poate produce în mod neașteptat și uneori neobservat. Cea mai bună prevenire a contaminării cu HEPATITA B este vaccinarea. Ori cine ar putea să aibe de a face cu sînge în timpul muncii, și nu are imunitate față de HEPATITA B, ar trebui să se lase vaccinat.

Dacă nu vă cunoașteți propria imunitate față de HEPATITA B, vă rugăm să întrebați medicul muncii!