

Vorgehen nach Nadelstichen

RUSSISCH

Мероприятия при повреждениях шприцевой иглой или при других контактах с кровью

Инструкция для лиц, постоянно или временно работающих по уборке помещений.

Почти на всех шприцевых иглах сохраняются следы крови. Один единственный укол такой иглой может привести к заражению гепатитом В, С реже СПИДом (AIDS). Последнее чаще бывает при ранении загрязнённым кровью скальпелем, зубным сверлом, канюлей для переливания крови, а также при прямом контакте с кровоточащей раной на коже или слизистой.

Гепатит В- это опасное, не всегда излечиваемое, заболевание печени, которое может примерно в 1% случаев уже через несколько недель привести к смертельному исходу или в 5-10% перейти в хроническую форму.

Если Вы укололись использованной шприцевой иглой или порезались, оставьте рану кровоточить, дезинфицируйте её и немедленно обратитесь к врачу Вашего учреждения (Бетрибсарцту) или, в случае его отсутствия, к другому врачу. В определении наличия риска заражения помогут пометки в Вашей истории болезни или анализ крови. Возможно, что активная или комбинированная активно-пассивная прививка обеспечит Вам необходимую защиту. Также в Ваших интересах указать имя пациента, кровью которого была загрязнена игла или канюля.

Пожалуйста, примите во внимание, что контакт с кровью может произойти в любой момент и не всегда остаётся замеченным. Поэтому самый лучший способ защиты- прививка против гепатита В. Каждому, ещё не привитому, у кого по роду работы не исключён контакт с кровью, рекомендуется сделать прививку.

Если Вы не знаете, защищены ли Вы от гепатита В, спросите у врача Вашего учреждения (Бетрибсарцта).