

## Vorgehen nach Nadelstichen

TÜRKISCH

### **İğne batmasından veya buna benzer kan temasından sonra gereken davranışlar – Temizlik işinde ve geçici olarak çalışan elemanlar için bilgiler**

Kullanılmış iğnelerin çoğunun ucunda kan kalıntıları bulunur. Belli hastalıkların bulaşması için tek bir iğne batması yeterli olabilir, sarılık (Kara ciğer iltahap B ve C tipi) ve çok nadir olarak AIDS gibi. Kullanılmış cerrah bıçağı dışı aletleri, veya kanlı infüzyon aletleri ile ileri gelen yaralar için de geçerlidir, aynı zamanda yaralanmış cilt ve sümüksü zar ile kan teması için söz konusudur.

Sarılık (Kara ciğer iltahap B tipi) tehlikeli, bazen tamamiyle iyileşeyen, yüzde bir kişide, bir kaç hafta içinde ölümü getiren bir karaciğer hastalığıdır, ve yüzde 5-10 hastada kronikleşir.

Bir iğne battığı veya bir tarafınızı kestiğiniz zaman, yarayı kanatın, dezenfekte edin ve hemen Personel doktoruna, kendisi bulunmadığı halde – bir başka doktora bildirin.

Dosyanıza bakarak veya kan tahlili yaparak bulaşma tehlikesi olup olmadığını öğrenilebilir. Belki korunmanız için aktif veya aktif/pasif bileştirmeli bir aşı gereklidir. İğnenin hangi hastaya ayet olduğunu bildirebilerseniz bize yardımcı olursunuz.

Kan temasını umulmuyacak şekilde ortaya çıktığını ve bazen hiç, farkedilmediğini lütfen hatırlayın. Sarılığa karşı en iyi önlem, sarılık aşısıdır. İşyerinde kan ile teması olabilen ve sarılık aşısı olmayan herkesin aşılması gereklidir.

**Sarılığa karşı aşınızın olup olmadığını bilmediğiniz halde, lütfen personel doktoru ile danışın.**